



SZCZEPIONKA	WIEK	w tygodniach:	w miesiącach										w latach							
		6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	od 18	od 60	
		U4		U5			U6		U7		U7a/U8		U9		U10		U11/J1		J2	
Rotawirusy		G1 ^a	G2	(G3)																
Tężec ^b		G1	N	G2	N	G3 ^c						N			A1	N	A2	N	A ^f	
Błonica ^b		G1	N	G2	N	G3 ^c						N			A1	N	A2	N	A ^f	
Koklusz ^b		G1	N	G2	N	G3 ^c						N			A1	N	A2	N	A3 ^f	N
Haemophilus influenzae Typu B ^b		G1	N	G2	N	G3 ^c						N								
Polio ^b		G1	N	G2	N	G3 ^c						N			A1		N			
Wirusowe zapalenie wątroby typu B ^b		G1	N	G2	N	G3 ^c														
Pneumokoki ^b		G1	N	G2	N	G3 ^c						N							S ^h	
Meningokoki z grupy B ^d		G1	N	G2	N			G3 ^d						N						
Odra						G1	N			G2						N			S ^g	
Świnka, Różyczka						G1	N			G2						N				
Varicella						G1	N			G2						N				
Meningokoki typu C								G1						N						
Wirus brodawczaka ludzkiego														G1 ^e G2 ^e		N				
COVID 19																		G ⁱ	S ⁱ	
Pólpasiec																		G1 ^j G2 ^j		
Grypa																		S (co roku)		

Terminy najbliższych szczepień



OBJAŚNIENIA

- G** UODPORNIENIE PODSTAWOWE
(w postaci do 3 szczepionek zęściowych G1 – G3)
- S** SZCZEPIONKA STANDARDOWA
- A** SZCZEPIONKA UZUPEŁNIAJĄCA
- N** SZCZEPIONKA NADRABIAJĄCA
(Uodpornienie wszystkich osób jeszcze nie zaszczepionych lub uzupełnienie niedokończonych serii szczepień)
- U** Badanie pozwalające na wczesne rozpoznanie
- J** Badanie młodzieży
(J1 w wieku 12–14 lat)

a Pierwsza dawka szczepionki powinna zostać podana już w wieku 6 tygodni, w zależności od zastosowanej szczepionki 2-ga lub 3-cia dawka w odstępach minimum 4 tygodni.
b Wcześnieiki: dodatkowa dawka szczepionki w wieku 3 miesięcy, tj. łącznie 4 dawki szczepionki. Mindestd.
c Minimalny odstęp czasowy od poprzedniej dawki: 6 miesięcy.
d 3 dawki w wieku od 2 do 23 miesięcy; od 24. miesiąca życia seria szczepień obejmuje 2 dawki.
e Dwie dawki szczepionki w odstępie co najmniej 5 miesięcy. W przypadku szczepienia nadrabiającego, rozpoczynającego się w wieku ≥ 15 lat lub w przypadku odstępów czasowych szczepienia < 5 miesięcy, pomiędzy 1-szą a 2-gą dawką wymagana jest 3-cia dawka.

f Td – szczepionka tężcowo-błonicza adsorbowana, co 10 lat. Następne przypadające jednorazowe szczepienie Td w postaci szczepionki Tdap lub, jeżeli jest to wskazane, jako szczepienie skojarzone Tdap-IPV.
g Jednorazowe szczepienie szczepionką MMR dla wszystkich osób urodzonych po roku 1970 w wieku ≥ 18 lat z niejasnym statusem szczepienia, które nie były szczepione lub były szczepione tylko raz w okresie dzieciństwa.
h Zalecane z PCV20
i W celu zapewnienia ochrony osób bez choroby zasadniczej wymagane są (co najmniej) 3 kontakty z antygenem, z których co najmniej jeden musi stanowić szczepienie.

j Stosować powtarzane szczepienie przypominające w odstępie przynajmniej 12 miesięcy od ostatniego kontaktu z antygenem, najlepiej jesienią.

* Szczepienia mogą być rozłożone na kilka terminów szczepień. Szczepionki MMR i V mogą być podawane w tym samym terminie lub w czterotygodniowych odstępach.